



## Zalew Brodzki - ostoja ptaków

Duży zbiornik wodny (o powierzchni ok. 260 ha) przyciąga wiele gatunków ptaków. Niektóre z nich odbywają tu lęgi a inne można spotkać tylko podczas przelotów na zimowiska lub na lęgowiska.

Jednym z najpopularniejszych gatunków ptaków nad zalewem jest kaczka krzyżówka. Samiec w szacie godowej ma zielono opalizującą głowę, odgraniczną od reszty ciała białą obrozą. Samica ma mniej kontrastowe ubarwienie. Ptaki te licznie gniazdują w tych okolicach i często można oglądać ich pisklęta w barwie żółtokremowej z czarnym wierzchem ciała i "przepaską" przez oko. Liczna grupa kaczek zimuje nad Zalewem Brodzkim i rzeką Kamienną.



Innym gatunkiem, który widoczny jest u nas prawie przez cały rok (także z młodymi), jest łąbędź niemy. Są to duże ptaki wodne. Wrażenia dostojeństwa dodaje im to, że gdy płyną po wodzie, czasem unoszą skrzydła w góręby pełniły rolę żagli. Samce z reguły wyraźnie większe od samic. Dorosłe osobniki nie nurkują, choć pisklęta mają tę umiejętność.

Czy wiesz, że dokarmiając łąbędzie chlebem możesz doprowadzić do ich osłabienia i zamarznienia? Wywołuje to u nich wyniszczające choroby układu pokarmowego! Dokarmienie ma sens tylko w okresach silnych mrozów,

gdy powierzchnia wody skuta jest lodem przez kilka, kilkanaście dni. Wtedy można im wykladać zboże a także drobno pokrojone warzywa - surowe bądź gotowane bez soli. Ptaki jedzą też ziarna kukurydzy, gotowane ziemniaki (bez soli), buraki pastewne, marchewkę, kapustę, płatki zbożowe, otręby. Pokarm wykładamy tylko w takiej ilości, którą ptaki zjedzą natychmiast - jeżeli wyłożymy go za dużo karma spleśnieje lub zamarźnie i spożyta przez ptaki może im zaszkodzić. Uwagi te dotyczą też dokarmiania kaczek.

Spośród ptaków wodnych, nad Zalewem Brodzkim często występują także gatunki:



perkoz dwuczuby



czapla siwa



kormaran zwyczajny